

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
1	1	<i>ANATIDÉS</i>								
2	2	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	NSPC	350-450				
3	3	Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i>	Latham, 1790	NSTR	0-1				E
4	4	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)			MO	HO		
5			– <i>C. c. bewickii</i>	Yarrell, 1830						
6	5	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linné, 1758)			MO	HO		
7	6	Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787)			MR	HO		
8		Oie de taïga	– <i>A. f. fabalis</i>	(Latham, 1787)						
9		Oie de toundra	– <i>A. f. rossicus</i>	Buturlin, 1933						
10	7	Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baillon, 1833			MO			
11	8	Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	(Scopoli, 1769)			MO	HO		
12			– <i>A. a. albifrons</i>	(Scopoli, 1769)						
13	9	Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	(Linné, 1758)	NSTR	1-2	MC	HTR		E
14			– <i>A. a. anser</i>	(Linné, 1758)						
15			– <i>A. a. rubrirostris</i>	Swinhoe, 1871						
16	10	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	(Linné, 1758)	NSPC	350				E
17			– <i>B. c. canadensis</i>	(Linné, 1758)						
18	11	Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	(Bechstein, 1803)			MTR	HTR		E
19	12	Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>	(Linné, 1758)			MO			
20			– <i>B. b. bernicla</i>	(Linné, 1758)						
21	13	Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>	(Pallas, 1769)			O			
22	14	Ouette d'Egypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	(Linné, 1766)	NSTR	1-6				E
23	15	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	(Pallas, 1764)	NSTR	1-5				E
24	16	Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	(Linné, 1758)	NTR	5-7	MTR	HTR		
25	17	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	(Linné, 1758)	NSR	20				E
26	18	Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	Linné, 1758			MR	HR		
27	19	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	Linné, 1758	NTR	1-3	MPC	HPC		
28	20	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	Linné, 1758	NTR	0-2	MPC	HPC		
29			– <i>A. c. crecca</i>	Linné, 1758						
30	21	Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i>	J. F. Gmelin, 1789			O			
31	22	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	Linné, 1758	NC	3 000-5 000	MC	HC		
32			– <i>A. p. platyrhynchos</i>	Linné, 1758						
33	23	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	Linné, 1758			MR	HTR		
34			– <i>A. a. acuta</i>	Linné, 1758						
35	24	Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	Linné, 1758	NO		MR	HO		
36	25	Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	Linné, 1766			O			
37	26	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	Linné, 1758	NTR	1-3	MPC	HPC		
38	27	Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	(Pallas, 1773)	NTR	15-20	MPC	HPC		
39	28	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	(Linné, 1758)	NTR	10-20	MC	HC		

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
79	58	Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	(Brünnich, 1764)			O			
80	59									
81	60	<i>HYDROBATIDÉS</i>								
82	61	Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>	(Linné, 1758)			O		XIXe	
83			– <i>H. p. pelagicus</i>	(Linné, 1758)						
84	62	Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1817)			O			
85			– <i>O. l. leucorhoa</i>	(Vieillot, 1817)						
86	63									
87	64	<i>SULIDÉS</i>								
88	65	Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	(Linné, 1758)			O			
89	66									
90	67	<i>PHALACROCORACIDÉS</i>								
91	68	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	(Linné, 1758)	NPC	500-550	MPC	HPC		
92			– <i>P. c. carbo</i>	(Linné, 1758)						
93			– <i>P. c. sinensis</i>	(Blumenbach, 1798)						
94	69	Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	(Linné, 1761)			MO	HO		
95			– <i>P. a. aristotelis</i>	(Linné, 1761)						
96	70									
97	71	<i>PÉLÉCANIDÉS</i>								
98	72	Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Linné, 1758			O			E
99	73									
100	74	<i>ARDÉIDÉS</i>								
101	75	Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	(Linné, 1758)	NO		MTR	HTR		
102			– <i>B. s. stellaris</i>	(Linné, 1758)						
103	76	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linné, 1766)	NTR	20	MTR			
104			– <i>I. m. minutus</i>	(Linné, 1766)						
105	77	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	(Linné, 1758)	NTR	10-20	MTR	HTR		
106			– <i>N. n. nycticorax</i>	(Linné, 1758)						
107	78	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)			MO			
108	79	Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>	(Linné, 1758)	NTR	1-2	MTR	HTR		
109			– <i>B. i. ibis</i>	(Linné, 1758)						
110	80	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	(Linné, 1766)	NTR	5	MTR	HTR		
111			– <i>E. g. garzetta</i>	(Linné, 1766)						
112	81	Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	Linné, 1758			MTR	HTR		
113			– <i>A. a. alba</i>	Linné, 1758						
114	82	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	Linné, 1758	NPC	450-460	MPC	HPC		
115			– <i>A. c. cinerea</i>	Linné, 1758						
116	83	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	Linné, 1766	NO		MTR			
117			– <i>A. p. purpurea</i>	Linné, 1766						

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
118	84									
119	85		<i>CICONIIDÉS</i>							
120	86	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	(Linné, 1758)	NO (?)		MTR			
121	87	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	(Linné, 1758)	NO (?)		MPC	HTR		
122			– <i>C. c. ciconia</i>	(Linné, 1758)						
123	88									
124	89		<i>THRESKIORNITHIDÉS</i>							
125	90	Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	(Linné, 1766)			MTR	HTR		
126			– <i>P. f. falcinellus</i>	(Linné, 1766)						
127	91	Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	(Latham, 1790)			O			E
128	92	Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	Linné, 1758			MTR			
129			– <i>P. l. leucorodia</i>	Linné, 1758						
130	93									
131	94		<i>PODICIPÉDIDÉS</i>							
132	95	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	(Pallas, 1764)	NPC	400	MPC	HPC		
133			– <i>T. r. ruficollis</i>	(Pallas, 1764)						
134	96	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	(Linné, 1758)	NPC	500-1000	MTR	HTR		
135			– <i>P. c. cristatus</i>	(Linné, 1758)						
136	97	Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	(Boddaert, 1783)	NO		MO	HO		
137			– <i>P. g. grisegena</i>	(Boddaert, 1783)						
138	98	Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	(Linné, 1758)			MTR	HTR		
139	99	Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	C. L. Brehm, 1831	NTR	3-9	MR	HTR		
140			– <i>P. n. nigricollis</i>	C. L. Brehm, 1831						
141	100									
142	101		<i>ACCIPITRIDÉS</i>							
143	102	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	(Linné, 1758)	NR	< 120	MPC			
144	103	Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)			MO			
145			– <i>E. c. caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)						
146	104	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	(Boddaert, 1783)	NR	20-25	MR			
147			– <i>M. m. migrans</i>	(Boddaert, 1783)						
148	105	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	(Linné, 1758)			MTR	HTR		
149			– <i>M. m. milvus</i>	(Linné, 1758)						
150	106	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linné, 1758)			MO	HO		
151	107	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	(Hablizl, 1783)			O			
152			– <i>G. f. fulvus</i>	(Hablizl, 1783)						
153	108	Vautour moine	<i>Aegyptius monachus</i>	(Linné, 1766)			O			
154	109	Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	NTR	1	MTR			
155	110	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	(Linné, 1758)	NTR	8-9	MR	HO		
156			– <i>C. a. aeruginosus</i>	(Linné, 1758)						

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
157	111	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	(Linné, 1766)	NR	25-90	MPC	HR		
158	112	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	(S. G. Gmelin, 1771)			O			
159	113	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	(Linné, 1758)	NTR	4-14	MTR			
160	114	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	(Linné, 1758)	NTR	8-11	MTR	HTR		
161			– <i>A. g. gentilis</i>	(Linné, 1758)						
162	115	Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	(Linné, 1758)	NPC	400-600	MPC	HPC		
163			– <i>A. n. nisus</i>	(Linné, 1758)						
164	116	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	(Linné, 1758)	NSPC	600-900	MPC	HPC		
165			– <i>B. b. buteo</i>	(Linné, 1758)						
166		Buse des steppes	– <i>B. b. vulpinus</i>	(Gloger, 1833)						
167	117	Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)				HO		
168			– <i>B. l. lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)						
169	118	Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>	Pallas, 1811			O			
170	119	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	NO (?)		MTR			
171	120	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linné, 1758)			O			
172			– <i>A. c. chrysaetos</i>	(Linné, 1758)						
173	121	Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>	Vieillot, 1822			O			
174			– <i>A. f. fasciata</i>	Vieillot, 1822						
175	122									
176	123	<i>PANDIONIDÉS</i>								
177	124	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	(Linné, 1758)	NTR	1	MR			
178			– <i>P. h. haliaetus</i>	(Linné, 1758)						
179	125									
180	126	<i>RALLIDÉS</i>								
181	127	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	Linné, 1758	NR	100-150	MR	HR		
182			– <i>R. a. aquaticus</i>	Linné, 1758						
183	128	Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	(Linné, 1766)	NO		MTR	HO		
184	129	Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i>	(Scopoli, 1769)			O			
185	130	Marouette de Baillon	<i>Zapornia pusilla</i>	(Pallas, 1776)			O			
186			– <i>Z. p. intermedia</i>	(Hermann, 1804)						
187	131	Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	(Linné, 1758)	NO (?)		MO			
188	132	Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	(Linné, 1758)			O			
189	133	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	(Linné, 1758)	NSC	5 000	MC	HC		
190			– <i>G. c. chloropus</i>	(Linné, 1758)						
191	134	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	Linné, 1758	NSC	3 000-4 000	MC	HC		
192			– <i>F. a. atra</i>	Linné, 1758						
193	135									
194	136	<i>GRUIDÉS</i>								
195	137	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	(Linné, 1758)			MC	HO		

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
196			– <i>G. g. grus</i>	(Linné, 1758)						
197	138									
198	139	<i>OTIDIDÉS</i>								
199	140	Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linné, 1758)	NO		MO			
200	141	Outarde barbue	<i>Otis tarda</i>	Linné, 1758			O			
201			– <i>O. t. tarda</i>	Linné, 1758						
202	142									
203	143	<i>BURHINIDÉS</i>								
204	144	Edicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>	(Linné, 1758)	NR	200	MR	HO		
205			– <i>B. o. oedicephalus</i>	(Linné, 1758)						
206	145									
207	146	<i>RÉCURVIROSTRIDÉS</i>								
208	147	Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	(Linné, 1758)	NO	0-2	MTR			
209			– <i>H. h. himantopus</i>	(Linné, 1758)						
210	148	Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Linné, 1758			MR	HTR		
211	149									
212	150	<i>HÉMATOPODIDÉS</i>								
213	151	Huitrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	Linné, 1758			MTR			
214			– <i>H. o. ostralegus</i>	Linné, 1758						
215	152									
216	153	<i>CHARADRIIDÉS</i>								
217	155	Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	(Linné, 1758)			MTR			
218	154	Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	(Linné, 1758)			MC	HC		
219	163	Guignard d'Eurasie	<i>Charadrius morinellus</i>	Linné, 1758			O			
220	161	Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Linné, 1758			O			
221	160	Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	Linné, 1758			MTR	HO		
222			– <i>C. h. hiaticula</i>	Linné, 1758						
223	159	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	Scopoli, 1786	NR	150	MPC			
224			– <i>C. d. curonicus</i>	J. F. Gmelin, 1789						
225	156	Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>	(Pallas, 1771)			O			
226	157	Vanneau à queue blanche	<i>Vanellus leucurus</i>	(Lichtenstein, 1823)			O			
227	158	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	(Linné, 1758)	NR	120-130	MC	HC		
228	162	Gravelot à collier interrompu	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Linné, 1758			MTR			
229			– <i>A. a. alexandrinus</i>	Linné, 1758						
230	164									
231	165	<i>SCOLOPACIDÉS</i>								
232	166	Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	(Linné, 1766)			MTR			
233			– <i>N. p. phaeopus</i>	(Linné, 1758)						
234	167	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	(Linné, 1758)	NTR	1	MTR	HTR		

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
235			– <i>N. a. arquata</i>	(Linné, 1758)						
236	168	Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	(Linné, 1758)			MR			
237			– <i>L. l. limosa</i>	(Linné, 1758)						
238			– (?) <i>L. l. islandica</i>	C. L. Brehm, 1831						
239	169	Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	(Linné, 1758)			MTR			
240			– <i>L. l. lapponica</i>	(Linné, 1758)						
241	170	Tournepipe à collier	<i>Arenaria interpres</i>	(Linné, 1758)			MTR			
242			– <i>A. i. interpres</i>	(Linné, 1758)						
243	171	Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	(Linné, 1758)			MTR			
244			– <i>C. c. canutus</i>	(Linné, 1758)						
245			– <i>C. c. islandica</i>	(Linné, 1767)						
246	172	Combattant varié	<i>Calidris pugnax</i>	(Linné, 1758)			MR	HO		
247	173	Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)			O			
248			– <i>C. f. falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)						
249	174	Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	(Pontoppidan, 1763)			MTR			
250	176	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)			MTR			
251	175	Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	(Pallas, 1764)			MTR			
252	177	Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	(Linné, 1758)			MR			
253			– <i>C. a. alpina</i>	(Linné, 1758)						
254			– (?) <i>C. a. schinzii</i>	(C. L. Brehm, 1822)						
255			– (?) <i>C. a. arctica</i>	(Schioler, 1922)						
256	178	Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	(Coues, 1861)			O			
257	179	Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	(Leisler, 1812)			MR	HO		
258	180	Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>	(Vieillot, 1819)			O			
259	181	Bécasseau rousset	<i>Calidris subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)			O			
260	182	Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)			O			
261	183	Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>	(Vieillot, 1819)			O			
262	184	Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linné, 1758)			MO			
263	185	Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linné, 1758)			MO			
264	186	Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i>	(Güldenstädt, 1775)			O			
265	187	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	(Linné, 1758)	NO	0-1	MPC	HTR		
266	188	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	(Linné, 1766)			O			
267	189	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	Linné, 1758			MPC	HTR		
268	190	Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	(Pallas, 1764)			MTR			
269	191	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	(Gunnerus, 1767)			MR	HO		
270	192	Chevalier stagnatille	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)			MO			
271	193	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	Linné, 1758			MTR			
272	194	Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	(Linné, 1758)			MR	HO		
273			– <i>T. t. totanus</i>	(Linné, 1758)						

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
274			– (?) <i>T. t. robusta</i>	(Schioler, 1919)						
275	195	Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	(Brünnich, 1764)			MR	HR		
276	196	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	Linné, 1758	NR	> 150	MPC	HPC		
277	197	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	(Linné, 1766)	NO		MPC	HR		
278			– <i>G. g. gallinago</i>	(Linné, 1758)						
279	198	Bécassine double	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)			O			
280	199									
281	200	<i>GLARÉOLIDÉS</i>								
282	201	Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	(Linné, 1766)			O			
283			– <i>G. p. pratincola</i>	(Linné, 1766)						
284	202	Courvite isabelle	<i>Cursorius cursor</i>	(Latham, 1787)			O		XIXe	
285			– <i>C. c. cursor</i>	(Latham, 1787)						
286	203									
287	204	<i>STERCORARIIDÉS</i>								
288	205	Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	(Temminck, 1815)			O			
289	206	Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	(Linné, 1758)			O			
290	207	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819			O			
291			– <i>S. l. longicaudus</i>	Vieillot, 1819						
292	208	Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>	Brünnich, 1764			O			
293	209									
294	210	<i>ALCIDÉS</i>								
295	211	Pingouin torda	<i>Alca torda</i>	Linné, 1758			O		XIXe	
296			– <i>A. t. islandica</i>	(Linné, 1758)						
297	212	Mergule nain	<i>Alle alle</i>	(Linné, 1758)			O			
298			– <i>A. a. alle</i>	(Linné, 1758)						
299	213	Guillemot de Troil	<i>Uria aalge</i>	(Pontoppidan, 1763)			O		XIXe	
300			– appartenance subsppécifique inconnue							
301	214									
302	215	<i>STERNIDÉS</i>								
303	216	Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	(Pallas, 1764)	NTR	4-10	MTR			
304			– <i>S. a. albifrons</i>	(Pallas, 1764)						
305	217	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(Gmelin)			O			
306			– <i>G. n. nilotica</i>	(J. F. Gmelin, 1789)						
307	218	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)			O			
308	219	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)			MTR			
309			– <i>C. h. hybrida</i>	(Pallas, 1811)						
310	220	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	(Linné, 1758)			MR			
311			– <i>C. n. niger</i>	(Linné, 1758)						
312	221	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)			MTR			

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
313	222	Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	Latham, 1787			MO			
314	223	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	Linné, 1758	NPC	200-250	MPC			
315			– <i>S. h. hirundo</i>	Linné, 1758						
316	224	Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Pontoppidan, 1763			MO			
317	225									
318	226	<i>LARIDÉS</i>								
319	227	Mouette de Sabine	<i>Xema sabini</i>	(Sabine, 1819)			O			
320	228	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	(Linné, 1758)			MTR	HTR		
321			– <i>R. t. tridactyla</i>	(Linné, 1758)						
322	229	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	(Linné, 1766)	NPC	1 500-2 000	MTC	HTC		
323	230	Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	(Pallas, 1776)			MR	HO		
324	231	Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>	Temminck, 1820	NPC	300-350	MPC	HR		
325	232	Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	Payraudeau, 1826			O			
326	233	Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	Linné, 1758	NTR	1-2	MR	HR		
327			– <i>L. c. canus</i>	Linné, 1758						
328	234	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815			O			
329	240	Goéland dominicain	<i>Larus dominicanus</i>	Lichtenstein, 1823			O			
330			– <i>L. d. vetula</i>	Bruch 1853						
331	235	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	Linné, 1758	NTR	5-10	MPC	MPC		
332			– <i>L. f. graellsii</i>	A. E. Brehm, 1857						
333			– <i>L. f. intermedius</i>	Schiöler, 1922						
334	236	Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	Pontoppidan, 1763	NR	50-100	MC	HC		
335			– <i>L. a. argentatus</i>	Pontoppidan, 1763						
336			– <i>L. a. argenteus</i>	C. L. Brehm, 1822						
337	237	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	Naumann, 1840	NTR	< 5	MPC	HPC		
338			– <i>L. m. michahellis</i>	Naumann, 1840						
339	238	Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	Pallas, 1811	NO		MTR	HTR		
340	239	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i>	Meyer, 1822			MO	HO		
341			– <i>L. g. glaucooides</i>	Meyer, 1822						
342	241	Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767			MO	MO		
343			– <i>L. h. hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767						
344	242	Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	Linné, 1758			MTR	HTR		
345	243									
346	244	<i>PTEROCLIDIDÉS</i>								
347	245	Syrnhapte paradoxal	<i>Syrnhaptes paradoxus</i>	(Pallas, 1773)			O		XIXe	
348	246									
349	247	<i>COLUMBIDÉS</i>								
350	248	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	J. F. Gmelin, 1789	NSTC	x 10 000				E
351			– <i>C. l. livia</i>	J. F. Gmelin, 1789						

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
352	249	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	Linné, 1758	NC	5 000	MC	HC		
353			– <i>C. o. oenas</i>	Linné, 1758						
354	250	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	Linné, 1758	NSTC	100 000	MTC	HTC		
355			– <i>C. p. palumbus</i>	Linné, 1758						
356	251	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	(Frivaldszky, 1838)	NSC	30 000-40 000				
357			– <i>S. d. decaocto</i>	(Frivaldszky, 1838)						
358	252	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	(Linné, 1758)	NC	2 500-4 400	MC			
359			– <i>S. t. turtur</i>	(Linné, 1758)						
360	253									
361	254	<i>CUCULIDÉS</i>								
362	255	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	(Linné, 1758)			O			
363	256	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	Linné, 1758	NC	4 000-5 000	MC			
364			– <i>C. c. canorus</i>	Linné, 1758						
365	257									
366	258	<i>TYTONIDÉS</i>								
367	259	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	(Scopoli, 1769)	NSR	300	MR	HR		
368			– <i>T. a. alba</i>	(Scopoli, 1769)						
369	260									
370	261	<i>STRIGIDÉS</i>								
371	262	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	(Linné, 1758)	NO					
372			– <i>O. s. scops</i>	(Linné, 1758)						
373	263	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	(Linné, 1758)			O			E
374			– <i>B. b. bubo</i>	(Linné, 1758)						
375	264	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	(Scopoli, 1769)	NSPC	490-750				
376			– <i>A. n. vidalii</i>	A. E. Brehm, 1857						
377	265	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	Linné, 1758	NSPC	1 500				
378			– <i>S. a. aluco</i>	Linné, 1758						
379			– <i>S. a. sylvatica</i>	Shaw, 1809						
380	266	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	(Linné, 1758)	NSPC	400				
381			– <i>A. o. otus</i>	(Linné, 1758)						
382	267	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)	NO	0-2	MO	HO		
383			– <i>A. f. flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)						
384	268									
385	269	<i>CAPRIMULGIDÉS</i>								
386	270	Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Linné, 1758	NPC	300	MPC			
387			– <i>C. e. europaeus</i>	Linné, 1758						
388	271									
389	272	<i>APODIDÉS</i>								
390	274	Martinet noir	<i>Apus apus</i>	(Linné, 1758)	NTC	35 000	MTC			

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
430	299	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Linné, 1758	NSPC	1 400-1 700	MPC	HPC		
431			– <i>F. t. tinnunculus</i>	Linné, 1758						
432	300	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Linné, 1766			MTR			
433	301	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Linné, 1758			MTR	HTR		
434			– <i>F. c. aesalon</i>	Tunstall, 1771						
435	302	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	Linné, 1758	NPC	210-360	MR			
436			– <i>F. s. subbuteo</i>	Linné, 1758						
437	303	Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonora</i>	Gené, 1839			O			
438	304	Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>	Linné, 1758			O			
439	305	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Tunstall, 1771	NSR	6-10	MTR	MTR		
440			– <i>F. p. peregrinus</i>	Tunstall, 1771						
441			– <i>F. p. calidus</i>	Latham, 1790						
442	306									
443	307	<i>PSITTACIDÉS</i>								
444	308	Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	(Scopoli, 1769)	NSR	> 1 000				E
445			– plusieurs sous-espèces introduites/échappées							
446	309									
447	310	<i>ORIOOLIDÉS</i>								
448	311	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	(Linné, 1758)	NPC	500-1 000	MPC			
449			– <i>O. o. oriolus</i>	(Linné, 1758)						
450	312									
451	313	<i>LANIIDÉS</i>								
452	314	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	Linné, 1758	NR	180-300	MR			
453	315	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	J. F. Gmelin, 1788			O			
454	316	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	Linné, 1758	NO		MTR	HTR		
455			– <i>L. e. excubitor</i>	Linné, 1758						
456	317	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	Linné, 1758			O			
457			– <i>L. s. senator</i>	Linné, 1758						
458	318									
459	319	<i>CORVIDÉS</i>								
460	320	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	(Linné, 1758)	NSTC	50 000	MPC			
461			– <i>P. p. pica</i>	(Linné, 1758)						
462	321	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	(Linné, 1758)	NSC	20 000	MO			
463			– <i>G. g. glandarius</i>	(Linné, 1758)						
464	322	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linné, 1758)			O			
465			– <i>N. c. macrorhynchos</i>	C. L. Brehm, 1823						
466	323	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	Linné, 1758	NSC	3 500	MC	HC		
467			– (?) <i>C. m. monedula</i>	Linné, 1758						
468			– <i>C. m. spermologus</i>	Vieillot, 1817						

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
469	324	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	Linné, 1758	NSC	5 000	MC	HC		
470			– <i>C. f. frugilegus</i>	Linné, 1758						
471	325	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	Linné, 1758	NSTC	50 000	MTC	HTC		
472			– <i>C. c. corone</i>	Linné, 1758						
473	326	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	Linné, 1758			O			
474			– <i>C. c. cornix</i>	Linné, 1758						
475	327									
476	328	REGULIDÉS								
477	329	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	(Linné, 1758)	NC	15 000	MTC	HTC		
478			– <i>R. r. regulus</i>	(Linné, 1758)						
479	330	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)	NPC	1 400-2 500	MPC	HPC		
480			– <i>R. i. ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)						
481	331									
482	332	RÉMIZIDÉS								
483	333	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linné, 1758)			MTR	HO		
484			– <i>R. p. pendulinus</i>	(Linné, 1758)						
485	334									
486	335	PARIDÉS								
487	336	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	(Linné, 1758)	NSTC	100 000	MTC	HTC		
488			– <i>C. c. caeruleus</i>	(Linné, 1758)						
489	337	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	Linné, 1758	NSTC	100 000-150 000	MTC	HTC		
490			– <i>P. m. major</i>	Linné, 1758						
491	338	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	(Linné, 1758)	NSC	5 000-8 500				
492			– <i>L. c. mitratus</i>	(C. L. Brehm, 1831)						
493	339	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	(Linné, 1758)	NSPC	500-750	MPC	HPC		
494			– <i>P. a. ater</i>	(Linné, 1758)						
495	340	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad von Baldenstein, 1827)	NSR	50				
496			– <i>P. m. rhenanus</i>	(Kleinschmidt, 1900)						
497	341	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	(Linné, 1758)	NSC	15 000				
498			– <i>P. p. palustris</i>	(Linné, 1758)						
499	342									
500	343	PANURIDÉS								
501	344	Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>	(Linné, 1758)	NO		MR	HTR		
502			– <i>P. b. biarmicus</i>	(Linné, 1758)						
503	345									
504	346	ALAUDIDÉS								
505	347	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	(Linné, 1758)	NSR	40	MR	HTR		
506			– <i>L. a. arborea</i>	(Linné, 1758)						
507	348	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	Linné, 1758	NTC	40 000-50 000	MTC	HTC		

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
508			– <i>A. a. arvensis</i>	Linné, 1758						
509	349	Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	(Linné, 1758)	NSR	50				
510			– <i>G. c. cristata</i>	(Linné, 1758)						
511	350	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linné, 1758)			O			
512			– <i>E. a. flava</i>	(J. F. Gmelin, 1789)						
513	351	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)	NO (?)		O			
514			– <i>C. b. brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)						
515	352	Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>	(Linné, 1766)			O		XIXe	
516			– <i>M. c. calandra</i>	(Linné, 1766)						
517	353									
518	354	<i>HIRUNDINIDÉS</i>								
519	355	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	(Linné, 1758)	NC	4 000	MC			
520			– <i>R. r. riparia</i>	(Linné, 1758)						
521	356	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)			O			
522	357	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Linné, 1758	NC	10 000	MC			
523			– <i>H. r. rustica</i>	Linné, 1758						
524	358	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	(Linné, 1758)	NC	10 000-25 000	MC			
525			– <i>D. u. urbicum</i>	(Linné, 1758)						
526	359	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	(Linné, 1771)			O			
527			– <i>C. d. rufula</i>	(Temminck, 1835)						
528	360									
529	361	<i>CETTIIDÉS</i>								
530	362	Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	(Temminck, 1820)	NR	30	MTR	HTR		
531			– <i>C. c. cetti</i>	(Temminck, 1820)						
532	363									
533	364	<i>AEGITHALIDÉS</i>								
534	365	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	(Linné, 1758)	NSC	10 000-15 000	MC	HC		
535			– <i>A. c. caudatus</i>	(Linné, 1758)						
536			– <i>A. c. europaeus</i>	(Hermann, 1804)						
537	366									
538	367	<i>PHYLLOSCOPIDÉS</i>								
539	368	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)			O			
540	369	Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	(Blyth, 1842)			O			
541			– appartenance subs spécifique inconnue							
542	370	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)	NPC	700-800	MPC			
543	371	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	(Bechstein, 1793)	NPC	500	MPC			
544	372	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	(Vieillot, 1817)	NTC	100 000	MTC	HTC		
545			– <i>P. c. collybita</i>	(Vieillot, 1817)						
546			– <i>P. c. abietinus</i>	(Nilsson, 1819)						

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
547		Pouillot de Sibérie	– <i>P. c. tristis</i>	Blyth, 1843						
548	373	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Ticehurst, 1937			MO			
549	374	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	(Linné, 1758)	NC	6 000-7 500	MC			
550			– <i>P. t. trochilus</i>	(Linné, 1758)						
551			– (?) <i>P. t. acredula</i>	(Linné, 1758)						
552	375									
553	376	<i>SYLVIIDÉS</i>								
554	377	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	(Linné, 1758)	NTC	300 000	MTC	HR		
555			– <i>S. a. atricapilla</i>	(Linné, 1758)						
556	378	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	(Boddaert, 1783)	NTC	20 000-30 000	MTC			
557			– <i>S. b. borin</i>	(Boddaert, 1783)						
558	379	Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1795)			O			
559			– <i>S. n. nisoria</i>	(Bechstein, 1795)						
560	380	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	(Linné, 1758)	NR	100-200	MPC			
561			– <i>S. c. curruca</i>	(Linné, 1758)						
562	381	Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	NO (?)		MO			
563			– <i>S. h. hortensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)						
564	382	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)			MO			
565		Fauvette des Balkans	– <i>S. c. albistriata</i>	C. L. Brehm, 1855						
566	383	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	Latham, 1787	NTC	21 000-36 000	MTC			
567			– <i>S. c. communis</i>	Latham, 1787						
568	384	Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	(Boddaert, 1783)	NSR	30-40				
569			– <i>S. u. dartfordiensis</i>	Latham, 1787						
570	385									
571	386	<i>TIMALIIDÉS</i>								
572	387	Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i>	(Scopoli, 1786)	NSR	60-80				
573			– appartenance subsppécifique inconnue							
574	388									
575	389	<i>LOCUSTELLIDÉS</i>								
576	390	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	(Boddaert, 1783)	NPC	1 000	MPC			
577			– <i>L. n. naevia</i>	(Boddaert, 1783)						
578	391	Locustelle lusciniode	<i>Locustella luscinioides</i>	(Savi, 1824)	NTR	1-5	MTR			
579			– <i>L. l. luscinioides</i>	(Savi, 1824)						
580	392									
581	393	<i>ACROCÉPHALIDÉS</i>								
582	394	Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieillot, 1817)	NO		MTR			
583	395	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	(Vieillot, 1817)	NC	7 000-12 000	MC			
584	396	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)			MO			
585	397	Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	(Linné, 1758)	NR	50	MR			

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
586	398	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	(Bechstein, 1798)	NPC	500	MPC			
587	399	Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	(Hermann, 1804)	NC	2 000-3 000	MC			
588			– <i>A. s. scirpaceus</i>	(Hermann, 1804)						
589	400	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linné, 1758)	NTR	10	MTR			
590			– <i>A. a. arundinaceus</i>	(Linné, 1758)						
591	401									
592	402	<i>CISTICOLIDÉS</i>								
593	403	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	(Rafinesque, 1810)	NO		MTR	HTR		
594			– <i>C. j. cisticola</i>	(Temminck, 1820)						
595	404									
596	405	<i>BOMBYCILLIDÉS</i>								
597	406	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linné, 1758)			MO	HO		
598			– <i>B. g. garrulus</i>	(Linné, 1758)						
599	407									
600	408	<i>TICHODROMIDÉS</i>								
601	409	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linné, 1766)				HTR		
602			– <i>T. m. muraria</i>	(Linné, 1766)						
603	410									
604	411	<i>SITTIDÉS</i>								
605	412	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	Linné, 1758	NSTC	30 000-50 000				
606			– <i>S. e. caesia</i>	Wolf, 1810						
607	413									
608	414	<i>CERTHIDÉS</i>								
609	415	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	C. L. Brehm, 1820	NSTC	50 000				
610			– <i>C. b. megarhyncha</i>	C. L. Brehm, 1831						
611	416									
612	417	<i>TROGLODYTIDÉS</i>								
613	418	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	(Linné, 1758)	NSTC	100 000	MTC	HTC		
614			– <i>T. t. troglodytes</i>	(Linné, 1758)						
615			– (?) <i>T. t. indigenus</i>	Clancey, 1937						
616	419									
617	420	<i>STURNIDÉS</i>								
618	421	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Linné, 1758	NTC	100 000	MTC	HTC		
619			– <i>S. v. vulgaris</i>	Linné, 1758						
620	422	Étourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>	(Linné, 1758)			O			
621	423									
622	424	<i>CINCLIDÉS</i>								
623	425	Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linné, 1758)	NO	1	MO			
624			– (?) <i>C. c. aquaticus</i>	Bechstein, 1803						

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
625	426									
626	427		<i>MUSCICAPIDÉS</i>							
627	428		<i>TURDINÉS</i>							
628	429	Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	(Nuttall, 1840)			O			
629			– <i>C. u. swainsonii</i>	(Tchudi, 1845)						
630	430	Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	Linné, 1758			MR	HO		
631			– <i>T. t. torquatus</i>	Linné, 1758						
632	431	Merle noir	<i>Turdus merula</i>	Linné, 1758	NTC	300 000	MTC	HTC		
633			– <i>T. m. merula</i>	Linné, 1758						
634	432	Grive obscure	<i>Turdus obscurus</i>	J. F. Gmelin, 1789			O			
635	433	Grive de Naumann	<i>Turdus naumanni</i>	Temminck, 1820			O			
636	434	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	Linné, 1758	NO		MC	HC		
637	435	Grive muscienne	<i>Turdus philomelos</i>	C. L. Brehm, 1831	NTC	100 000	MTC	HTC		
638			– <i>T. p. philomelos</i>	C. L. Brehm, 1831						
639			– <i>T. p. clarkei</i>	Hartert, 1909						
640	436	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	Linné, 1766			MTC	HTC		
641			– <i>T. i. iliacus</i>	Linné, 1766						
642			– <i>T. i. coburni</i>	Sharpe, 1901						
643	437	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	Linné, 1758	NC	5 000-10 000	MC	HC		
644			– <i>T. v. viscivorus</i>	Linné, 1758						
645	438									
646	439		<i>MUSCICAPINÉS</i>							
647	440	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	(Pallas, 1764)	NC	3 000	MC			
648			– <i>M. s. striata</i>	(Pallas, 1764)						
649	441	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	(Linné, 1758)	NSTC	200 000	MTC	HTC		
650			– <i>E. r. rubecula</i>	(Linné, 1758)						
651	442	Rossignol progré	<i>Luscinia luscinia</i>	(Linné, 1758)			O			
652	443	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C. L. Brehm, 1831	NC	20 000	MC			
653			– <i>L. m. megarhynchos</i>	C. L. Brehm, 1831						
654	444	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	(Linné, 1758)	NTR	20	MTR			
655		Gorgebleue à miroir blanc	– <i>L. s. cyaneula</i>	(Meisner, 1804)						
656	445	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1794)			O			
657	446	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)			O		XIXe	
658	447	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)	NR	150-250	MPC			
659			– <i>F. h. hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)						
660	448	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	(S. G. Gmelin, 1774)	NTC	20 000-30 000	MC	HR		
661			– <i>P. o. gilbraltariensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)						
662	449	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	(Linné, 1758)	NC	4 000	MPC			
663			– <i>P. p. phoenicurus</i>	(Linné, 1758)						

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
664	450	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	(Linné, 1758)	NO		MR			
665	451	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	(Linné, 1766)	NC	3 000-5 000	MPC	HTR		
666			– <i>S. r. rubicola</i>	(Linné, 1766)						
667	452	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	(Linné, 1758)	NO	0-1	MC			
668			– <i>O. o. oenanthe</i>	(Linné, 1758)						
669			– <i>O. o. leucorhoa</i>	(J. F. Gmelin, 1789)						
670	453	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linné, 1758)			O			
671			– (?) <i>O. h. hispanica</i>	(Linné, 1758)						
672	454									
673	455	<i>PRUNELLIDÉS</i>								
674	456	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)			O			
675			– <i>P. c. collaris</i>	(Scopoli, 1769)						
676	457	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	(Linné, 1758)	NSTC	80 000-200 000	MTC	HTC		
677			– <i>P. m. modularis</i>	(Linné, 1758)						
678			– <i>P. m. occidentalis</i>	(Hartert, 1910)						
679	458									
680	459	<i>PASSÉRIDÉS</i>								
681	461	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	(Linné, 1758)	NSTC	0,5-1M				
682			– <i>P. d. domesticus</i>	(Linné, 1758)						
683	462	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	(Linné, 1758)	NSPC	500				
684			– <i>P. m. montanus</i>	(Linné, 1758)						
685	460	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	(Linné, 1766)			O		XIXe	
686			– <i>P. p. petronia</i>	(Linné, 1766)						
687	463									
688	464	<i>MOTACILLIDÉS</i>								
689	465	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	Linné, 1758	NC	5 000	MPC			
690			– <i>M. f. flava</i>	(Linné, 1758)						
691		Berg. nordique	– <i>M. f. thunbergi</i>	Billberg, 1828			MPC			
692		Berg. des Balkans	– <i>M. f. feldegg</i>	Michahelles, 1830			O			
693		Berg. flavéole	– <i>M. f. flavissima</i>	(Blyth, 1834)	NO		MTR			
694		Berg. ibérique	– <i>M. f. iberiae</i>	Hartert, 1921			MTR			
695	466	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	Tunstall, 1771	NPC	500-700	MPC	HPC		
696			– <i>M. c. cinerea</i>	Tunstall, 1771						
697	467	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	Linné, 1758	NC	5 000	MC	HPC		
698			– <i>M. a. alba</i>	Linné, 1758						
699		Bergeronnette de Yarrell	– <i>M. a. yarrellii</i>	Gould, 1837	NO		MTR	HTR		
700	468	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818			O			
701			– <i>A. r. richardi</i>	Vieillot, 1818						
702	469	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	(Linné, 1758)	NO		MTR			

IDF 2018	Classement espèces	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	AUTORITÉ	Nicheur (N)	Effectifs nicheurs Atlas IDF 2017	Migrateur (M)	Hivernant (H)	XIXe siècle	E = Echappés ou introduits
703			– <i>A. c. campestris</i>	(Linné, 1758)						
704	470	Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>	Richmond, 1907			O			
705			– <i>A. h. yunnanensis</i>	Uchida & Kuroda, 1916						
706	471	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	(Linné, 1758)	NC	3 000-5 000	MPC			
707			– <i>A. t. trivialis</i>	(Linné, 1758)						
708	472	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	(Linné, 1758)	NPC	500	MTC	HPC		
709			– <i>A. p. pratensis</i>	(Linné, 1758)						
710	473	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)			MTR			
711	474	Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	(Montagu, 1798)			MTR	HTR		
712			– <i>A. p. littoralis</i>	C. L. Brehm, 1823						
713	475	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	(Linné, 1758)			MPC	HPC		
714			– <i>A. s. spinoletta</i>	(Linné, 1758)						
715	476									
716	477	FRINGILLIDÉS								
717	479	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	(Linné, 1758)			MC	HC		
718	478	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	Linné, 1758	NTC	200 000-300 000	MTC	HTC		
719			– <i>F. c. coelebs</i>	Linné, 1758						
720	480	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	(Linné, 1758)	NSPC	1 000	MPC	HPC		
721			– <i>C. c. coccothraustes</i>	(Linné, 1758)						
722	481	Roselin cramoiisi	<i>Erythrina erythrina</i>	(Pallas, 1770)			O			
723			– <i>E. e. erythrina</i>	(Pallas, 1770)						
724	482	Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>	(Linné, 1758)			O			
725			– <i>P. e. enucleator</i>	(Linné, 1758)						
726	483	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	(Linné, 1758)	NSC	3 000-5 000				
727			– <i>P. p. pyrrhula</i>	(Linné, 1758)						
728			– <i>P. p. europaea</i>	Vieillot, 1816						
729	484	Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	(Linné, 1758)	NTC	25 000-50 000	MTC	HTC		
730			– <i>C. c. chloris</i>	(Linné, 1758)						
731			– (?) <i>C. c. harrisoni</i>	(Clancey, 1940)						
732	485	Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	(Linné, 1758)	NC	5 000-7 500	MC	HC		
733			– <i>L. c. cannabina</i>	(Linné, 1758)						
734	486	Linotte à bec jaune	<i>Linaria flavirostris</i>	(Linné, 1758)			O			
735			– <i>L. f. flavirostris</i>	(Linné, 1758)						
736	487	Sizerin cabaret	<i>Acanthis cabaret</i>	(P. L. Stadius Müller, 1776)	NO		MPC	HPC		
737	488	Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	(Linné, 1758)			MR	HR		
738		Sizerin boréal	– <i>A. f. flammea</i>	(Linné, 1758)						
739			– <i>A. f. rostrata</i>	(Coues, 1862)						
740	489	Sizerin blanchâtre	<i>Acanthis hornemanni</i>	(Holboell, 1843)			O			
741			– <i>A. h. exilipes</i>	(Coues, 1862)						

